

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 2-6-83170534

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-67

26 MAI 1983

BULLETIN N°8 destiné aux agriculteurs du LAURAGAIS

(rédigé en collaboration avec la ferme de LOUDES,
les G.V.A. et l'I.T.C.F.)

Observez

les parcelles qui ont déjà bénéficié d'un traitement. La persistance d'action des spécialités conseillées est de l'ordre de 21 jours. Si vous constatez la présence de nouvelles pustules fraîches de rouille brune sur la Fl, vous devez renouveler la protection de vos cultures.

Traitez

avec Tilt C 1 l/hectare

Vigil K 1,25 l/hectare

Ce traitement assurera la protection des épis vis-à-vis de la septoriose, limitera les risques de fusariose et sera également efficace contre l'oïdium.

L'oïdium se montre très actif, en particulier, sur Roazon, mais les cultures ont déjà du profiter d'une protection fongicide.

Surveillez

les pucerons. Il faut traiter si un épi sur deux est colonisé par au moins 5 pucerons.

Utilisez Pirimor G à raison de 0,250 kilo à l'hectare dont le mélange est possible avec les fongicides précités.

Tirage du 26 mai 1983 - 1 000 exemplaires

© Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1983

P40